

**SYXYL**

Aus der Natur. In die Balance.

PRODUKT-  
KOMPENDIUM  
**2018**



# Alphabetisches Verzeichnis der Syxyl-Präparate

<b>Bezeichnung</b>	<b>Darreichungsform</b>	<b>Segment</b>	<b>Seite</b>
Aminosyx®	Tabletten	Tag-Nacht-Balance	6
Basosyx® Classic	Tabletten	Säure-Basen-Balance	8
Basosyx® Hepa	Tabletten	Säure-Basen-Balance	9
Drüfusan Tabletten	Tabletten	Syxyl-Spezialitäten	11
Ginkgo Syxyl Tabletten	Tabletten	Syxyl-Spezialitäten	13
Harnsäuretropfen F Syxyl	Tropfen	Bewegungsapparat/Rheuma	16
MedEctoin Syxyl	Creme	Haut	18
Milzimmunosyx	Tropfen	Lymphatisches System	19
ProBio-Cult® Duo	Kapseln	Darmflora-Balance	21
ProBio-Cult® Junior	Sticks	Darmflora-Balance	23
ProBio-Cult® Pur 15	Kapseln	Darmflora-Balance	25
ProBio-Dent®	Tabletten	Mundflora-Balance	27
Regacan®	Tabletten	Immun-Balance	28
Regazym® Plus	Tabletten	Enzym-Balance	29
Remisyx®	Tropfen	Milieu-Balance	31
Selen-Forte Syxyl	Tabletten	Immun-Balance	32

# Rezeptierhinweise

<b>Anwendung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Altersjuckreiz	MedEctoin Syxyl	18
Antioxidantien	Selen-Forte Syxyl	32
Bewegungsapparat (Rheuma)	Harnsäuretropfen F Syxyl	16
Darmflora	ProBio-Cult® Junior Remisyx®	23 31
Darmflora (Pflege)	ProBio-Cult® Junior ProBio-Cult® Pur 15	23 25
Darmflora (Störungen)	ProBio-Cult® Duo	21
Darmsanierung nach antibiotischer Therapie	ProBio-Cult® Duo ProBio-Cult® Junior Remisyx®	21 23 31
Entspannung	Aminosyx®	6
Enzyme	Regazym® Plus	29
Gicht	Harnsäuretropfen F Syxyl	16
Harnsäure Diathese	Harnsäuretropfen F Syxyl	16
Harnsäureüberladung des Blutes	Harnsäuretropfen F Syxyl	16
Haut – trockene, spröde, empfindliche	MedEctoin	18
Homöopathisch registrierte Arzneimittel	Drüfusan Tabletten Ginkgo Syxyl Tabletten	11 13
Immunabwehr reduziert durch Selenmangel	Selen-Forte Syxyl	32
Immunmodulation	Regacan®	28
Immunsystem	Regacan®	28
Juckreiz	MedEctoin Syxyl	18

# Rezeptierhinweise

<b>Anwendung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Kariesprophylaxe	ProBio-Dent®	27
Leber-Balance	Basosyx® Hepa	9
Magen-Darm-Beschwerden	ProBio-Cult® Duo	21
Milieu-Balance	Remisyx®	31
Milzfunktionsstörungen	Milzimmunosyx	19
Mundpflege	ProBio-Dent®	27
Neurodermitis	MedEctoin Syxyl	18
Psoriasis	MedEctoin Syxyl	18
Parodontoseprophylaxe	ProBio-Dent®	27
Rheumatischer Formenkomplex	Harnsäuretropfen F Syxyl	16
Säure-Basen-Haushalt	Basosyx® Classic Basosyx® Hepa	8 9
Schlaf	Aminosyx®	6
Schüßler Salze	Drüfusan Tabletten	11
Selenmangel (zur diätetischen Behandlung eines Selenmangels z. B.: bei reduzierter Immunabwehr, bei Fehl- und Mangelernährung, nach Strahlen- und Chemotherapie, im Rahmen der Krebsnachsorge)	Selen-Forte Syxyl	32
Störungen der Milzfunktion	Milzimmunosyx	19
Tag-Nacht-Balance	Aminosyx®	6
Trockene Haut	MedEctoin Syxyl	18
Zahnpflege	ProBio-Dent®	27

# AMINOSYX®

## TAG-NACHT-BALANCE

Mit B-Vitaminen für das Nervensystem

Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:** Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Taurin\*, L-Argininmonohydrochlorid, L-Glutamin, L-Tyrosin, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Guaranaextraktpulver\* (Maltodextrin, Koffein, Guaranaextrakt), L-Tryptophan\*\*, pflanzliches Fett (ganz gehärtetes Palmfett), Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Polyethylenglycol), Farbstoff Titandioxid, Nicotinamid, Kupfergluconat, Farbstoff Eisenoxid\*, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>).

\* Nur in der Tablette für den Morgen (rot) enthalten /

\*\* Nur in der Tablette für den Abend (weiß) enthalten

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Zusammen- setzung je Tagesportion	2 Tabl.	4 Tabl.	NRV* 2/4 Tabl.
Folsäure	100 µg	200 µg	50 % / 100 %
Kupfer	0,5 mg	1 mg	50 % / 100 %
Niacin (Vitamin B <sub>3</sub> )	8 mg	16 mg	50 % / 100 %
Riboflavin (Vitamin B <sub>2</sub> )	0,7 mg	1,4 mg	50 % / 100 %
Pyridoxin (Vitamin B <sub>6</sub> )	0,7 mg	1,4 mg	50 % / 100 %
Thiamin (Vitamin B <sub>1</sub> )	0,55 mg	1,1 mg	50 % / 100 %
Cyanocobalamin (Vitamin B <sub>12</sub> )	1,25 µg	2,5 µg	50 % / 100 %
L-Arginin	125 mg	250 mg	**
L-Glutamin	125 mg	250 mg	**
Taurin*	250 mg	n. a.	**
L-Tyrosin	125 mg	250 mg	**
L-Tryptophan**	100 mg	n. a.	**
Guaranaextraktpulver* (enthält 5 mg Koffein pro Tablette)	100 mg	n. a.	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

+ nur in der Tablette für den Morgen (rote Tablette) enthalten

++ nur in der Tablette für den Abend (weiße Tablette) enthalten

**Verzehrempfehlung:** Morgens 2 rote Tabletten und gegen Abend 2 weiße Tabletten einnehmen.

Die Tagesdosis von 2 (4) Tabletten **Aminosyx®** deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Kupfer zu 50 % (100 %), an Folsäure zu 50 % (100 %), an Vitamin B<sub>3</sub> zu 50 % (100 %), an Vitamin B<sub>2</sub> zu 50 % (100 %), an Vitamin B<sub>6</sub> zu 50 % (100 %), an Vitamin B<sub>1</sub> zu 50 % (100 %) und an Vitamin B<sub>12</sub> zu 50 % (100 %) gemäß Lebensmittel-Informationsverordnung.

**Hinweis:** Enthält Koffein. **Aminosyx®** ist nicht für Schwangere, Stillende sowie Kinder und Jugendliche geeignet. Bei der Einnahme von Antidepressiva sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt oder Therapeuten gehalten werden.

**Aminosyx®** bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Es enthält pflanzliche Bestandteile und Naturstoffe, die gewissen Farbschwankungen unterliegen können. Leichte farbliche Unterschiede können daher auftreten und beeinflussen nicht die Qualität des Produktes.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten.

**Erhältliche Packung:**

80,7 g (60 Tabletten à 655 mg + 60 Tabletten à 690 mg), PZN: 13837314

**Aminosyx®** ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ gelatinefrei
- ✔ vegan

# BASOSYX<sup>®</sup>

## CLASSIC

### SÄURE-BASEN-BALANCE

#### Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Algenpulver und Spargelpulver

**Zutaten:** Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Füllstoff Cellulose, Maisstärke, Zinkgluconat, Kaliumcitrat, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Spargelpulver (0,3%), Spirulinaalgenpulver (0,3%).

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	4 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 4/6 Tabl.
Calcium	644 mg	966 mg	81% / 121%
Magnesium	211 mg	316 mg	56% / 84%
Zink	10 mg	15 mg	100% / 150%

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Verzehrempfehlung:** Nehmen Sie 2 Tabletten ca. 1 Stunde nach den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) oder 4 Tabletten vor dem zu Bett gehen.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

**Hinweis:** Da in **Basosyx<sup>®</sup> Classic** Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Magnesiumpräparate können bei empfindlichen Personen eine leicht abführende Wirkung haben.

#### **Erhältliche Packung:**

Packung mit 98,0 g (140 Tabletten á 700 mg), PZN: 13837277

**Basosyx<sup>®</sup> Classic** ist:

- ✓ gelatinefrei
- ✓ glutenfrei
- ✓ laktosefrei
- ✓ hefefrei
- ✓ natriumfreie Mineralstoffverbindungen
- ✓ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✓ vegan

# BASOSYX®

## HEPA

### SÄURE-BASEN-BALANCE UND LEBER-BALANCE

**Mit Cholin zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion  
und Zink für den Säure-Basen-Haushalt**

#### Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:** Füllstoffe (Cellulose, Calciumphosphate), Calciumbisglycinat, Kaliumchlorid, Cholintratarat, Maisstärke, Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren, Polyethylenglycol), Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum), wässriger Trockenextrakt (1:1:1) (Maltodextrin, Artischockenextrakt, Mariendisteleextrakt, Löwenzahnextrakt, Trennmittel Siliciumdioxid), Calciumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, Magnesiumoxid, Cholicitrat, pflanzliches Öl (Palmkern, Kokosnuss, in veränderlichen Gewichtsanteilen), Magnesiumcarbonat, Farbstoff Titandioxid, Zinkcitrat, Natriummolybdat.

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Zusammen- setzung je Tagesportion	4 Tabl.	6 Tabl.	NRV* 4/6 Tabl.
Mineralstoffe			
Kalium	200 mg	300 mg	10 % / 15 %
Calcium	80 mg	120 mg	10 % / 15 %
Magnesium	40 mg	60 mg	11 % / 16 %
Zink	3,3 mg	5 mg	33 % / 50 %
Molybdän	16,7 µg	25 µg	33 % / 50 %
Pflanzliche Zutaten			
Wässriger Trockenextrakt 1:1:1 aus Artischocke, Löwenzahn und Mariendistel	133 mg	200 mg	**
Weitere Zutaten			
Cholin	133 mg	200 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden



**Verzehrempfehlung:** Nehmen Sie täglich je 3 Tabletten morgens und abends nach der Mahlzeit oder 4 Tabletten vor dem zu Bett gehen mit ausreichend Flüssigkeit ein.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

**Hinweise:** Da in **Basosyx® Hepa** Naturstoffe enthalten sind, können bei den Tabletten leichte Farbunterschiede auftreten.

Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

**Erhältliche Packung:**

Packung mit 48,5 g (60 Tabletten à 808 mg), PZN: 10110505

Packung mit 113,1 g (140 Tabletten à 808 mg), PZN: 10110511

**Basosyx® Hepa** ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ hefefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ vegan

# DRÜFUSAN TABLETTEN

Registriernummer: 67123.00.00

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

<b>Zusammensetzung</b>	
Wirkstoffe	1 Tablette enthält
Acidum silicicum Trit. D6	20,0 mg
Calcium fluoratum Trit. D6	20,0 mg
Calcium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Calcium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Ferrum phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Kalium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Kalium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium chloratum Trit. D6	21,0 mg
Magnesium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium phosphoricum Trit. D6	21,0 mg
Natrium sulfuricum Trit. D6	21,0 mg

Gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat (pflanzlich), Kartoffelstärke.

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

**Gegenanzeigen:** Bisher sind keine Gegenanzeigen zu **Drüfusan Tabletten** bekannt.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie **Drüfusan Tabletten** erst nach Rücksprache mit dem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:** Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt. Bei Einnahme von **Drüfusan Tabletten** zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Allgemeiner Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Hinweis: Bitte bewahren Sie Drüfusan Tabletten stets in dem Umkarton verschlossen und nicht zu warm (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Erhältliche Packungsgrößen:**

Packung mit 100 Tabletten, PZN: 03215066

# GINKGO SYXYL TABLETTEN

**Registriernummer: 4751.01.01**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

<b>Zusammensetzung</b>	
Wirkstoffe	1 Tablette enthält
Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 (HAB Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62% m/m)	100 mg

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Kartoffelstärke.

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angaben einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

**Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Ginkgo-biloba-Zubereitungen oder einen sonstigen Bestandteil von Ginkgo Syxyl Tabletten in der Schwangerschaft. Kinder unter 6 Jahren.

**Stillzeit:** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nicht angewendet werden.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 6 - 18 Jahren nicht angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wurden aus Berichten zu pflanzlichen Extrakten aus Ginkgo biloba abgeleitet:

Patienten mit einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) und gleichzeitiger Einnahme von gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzen, z.B. Phenprocoumon) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z.B. ASS) sollten Ginkgo Syxyl Tabletten nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zubereitungen aus Ginkgo können zu einer Verstärkung der Blutungsneigung führen, die Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten sollte deshalb 3 bis 4 Tage vor einer Operation vorsichtshalber beendet werden.

Bei Patienten mit Epilepsie kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen das Auftreten weiterer Anfälle gefördert wird.

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-haltigen Produkten und Efavirenz wird nicht empfohlen.

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie Ginkgo Syxyl Tabletten erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erbten Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Die folgenden Wechselwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

Wird das Arzneimittel **Ginkgo Syxyl Tabletten** gleichzeitig mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulanzen, z. B. Phenprocoumon und Warfarin) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z.B. Clopidogrel, Acetylsalicylsäure und andere nicht-steroidale Anthiphlogistika [z.B Ibuprofen, Diclofenac] angewendet, kann deren Effekt beeinflusst werden.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Ginkgo biloba mit Warfarin, Dabigatran oder Nifedipin (Erhöhung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut).

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-Zubereitungen und Efavirenz wird nicht empfohlen (Erniedrigung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut). Bitte informieren Sie einen Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene: Bei akuten Umständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Allgemeiner Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** Die folgenden Nebenwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

- Blutungen in verschiedenen Organen (Augen, Nase, Hirn- und Magen-Darm-Blutungen)
- Kopfschmerzen und Schwindel
- Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen
- Überempfindlichkeit (allergischer Schock)
- allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung, Juckreiz und Ausschlag)

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Hinweis: Bitte bewahren Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Erhältliche Packungsgrößen:**

Packung mit 120 Tabletten zum Einnehmen N1, PZN: 07610888

# HARNSÄURETROPFEN F SYXYL

Zulassungsnummer: 6838619.00.00

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates

Zusammensetzung	
10,0 g enthalten: Wirkstoffe:	
Berberis vulgaris Dil. D6	5,00 g
Colchicum autumnale Dil. D6	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch. 10 ml entsprechen 9,28 g.  
1 g = 33 Tropfen

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Behandlung von Gicht und Rheuma.**

Hinweis: Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

**Gegenanzeigen:** **Harnsäuretropfen F Syxyl** dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Berberis vulgaris, Colchicum autumnale oder einen der sonstigen Bestandteile sind. **Harnsäuretropfen F Syxyl** sind bei Alkoholkranken nicht anzuwenden. Wegen des Alkoholgehaltes sollen **Harnsäuretropfen F Syxyl** bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält 51 Vol.-% Alkohol.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** In der Schwangerschaft und Stillzeit sind **Harnsäuretropfen F Syxyl** nicht anzuwenden.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Die Anwendung bei Jugendlichen ab 12 bis 18 Jahren sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen sollten Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5 - 10 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Hinweis: Bitte bewahren Sie **Harnsäuretropfen F Syxyl** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Erhältliche Packungsgrößen:**

Packung mit 100 ml Lösung, PZN: 00254321



# MEDECTOIN SYXYL

Medizinprodukt zur äußerlichen Behandlung bei Neurodermitis, Psoriasis sowie bei trockener, spröder, empfindlicher Haut und Juckreiz.

**Zusammensetzung:** Aqua, Cetearyl Alcohol, Ectoin®, Urea, Cetearyl Isononanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba Oil), Hydrogenated Polydecene, Pentylene Glycol, Hydroxyethyl Urea, Panthenol, Cetearyl Glucoside, Lecithin, Allantoin, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Sodium Lactate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triacetin.

**Anwendung: MedEctoin Syxyl** ist ein Medizinprodukt zur äußerlichen Anwendung bei trockener, spröder, empfindlicher Haut und Juckreiz sowie bei Neurodermitis und Psoriasis. **MedEctoin Syxyl** wird wie ein dünner Film mehrmals täglich auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen und dann sanft und vollständig verrieben. Auf Grund seiner Zusammensetzung kann das Präparat auch langfristig regelmäßig angewendet werden.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen wird empfohlen **MedEctoin Syxyl** nur von einem Patienten zu nutzen.

**MedEctoin Syxyl** soll nicht auf akut entzündete Hautpartien angewendet werden. **MedEctoin Syxyl** ist nur für die topische Anwendung auf der Haut bestimmt. **MedEctoin Syxyl** darf nicht angewendet werden bei Sensibilisierung gegenüber Ectoin® oder einem der sonstigen Inhaltsstoffe der Creme.

Bei gereizter oder empfindlicher Haut kann es in seltenen Einzelfällen nach dem Auftragen von **MedEctoin Syxyl** zu einem kurzfristigen Brennen auf der Haut kommen.

In seltenen Fällen kann es zu kurzzeitigen Hautreizungen, Hautrötungen und Juckreiz kommen. Bitte setzen Sie in diesen Fällen **MedEctoin Syxyl** unverzüglich ab und halten Rücksprache mit Ihrem Therapeuten oder Apotheker.

**Wenn Ihre Symptome sich verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt/Therapeuten aufsuchen.**

Es liegen keine Daten zu Wechselwirkungen zwischen **MedEctoin Syxyl** und anderen Cremes vor. Dies gilt auch für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit. Bitte halten Sie in diesen Fällen Rücksprache mit Ihrem Arzt/Therapeuten.

Auch für Kinder und Kleinkinder geeignet!

Lagerungshinweis: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Tube und auf der Faltschachtel aufgedruckt.

**MedEctoin Syxyl** soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate. Bei Raumtemperatur zwischen 2° und 25° C aufbewahren. Bitte **MedEctoin Syxyl** außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.



**Darreichungsform und Inhalt:**

Creme mit 30 ml, PZN: 13865629

# MILZIMMUNOSYX

**Zulassungsnummer: 6856304.00.00**

Homöopathisches Arzneimittel bei Störungen der Milzfunktion

<b>Zusammensetzung</b>	
10,0 g Mischung flüssiger Verdünnungen enthalten: Wirkstoffe:	
Ceanothus americanus Dil. D3	5,00 g
Cinchona pubescens Dil. D3	5,00 g

Hergestellt nach homöopathischem Arzneibuch.  
10 ml entsprechen 8,864 g. 1 ml entsprechen 34 Tropfen.

**Anwendungsgebiete:** Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: **Die unterstützende Behandlung bei Störungen der Milzfunktion.**

Hinweis: Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer weiteren ärztlichen Abklärung bedürfen.

**Gegenanzeigen:** Milzimmunosyx darf nicht angewendet werden:

- bei Überempfindlichkeit gegen Chinin oder Chinarinde
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die anderen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von **Milzimmunosyx** sind.
- bei Alkoholkranken

Wegen des Alkoholgehaltes soll **Milzimmunosyx** bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden..

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol.-% Alkohol.

**Schwangerschaft und Stillzeit:** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Kinder:** Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:** Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5 - 10 Tropfen ein. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 5 -10 Tropfen ein.

Allgemeiner Hinweis: Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Nebenwirkungen:** In seltenen Fällen können nach Einnahme von chinin- oder chinarindehaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen. Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung)..

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Bitte bewahren Sie **Milzimmunosyx** stets in dem Umkarton verschlossen und nicht über 25 °C (vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt) auf. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Erhältliche Packungsgrößen:**

Packung mit 50 ml Lösung N1, PZN: 03208818

# PROBIO-CULT®

## DUO

### DARMFLORA-BALANCE

#### Zur diätetischen Behandlung von Störungen der Darmflora und nach Antibiotikaeinnahme

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke  
(Ergänzende bilanzierte Diät)

**Zutaten:** Füllstoffe (Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), L-Glutamin, Glucose, Milchsäurebakterien (7,4 %) (**LA-5® Lactobacillus acidophilus**, **BB-12® Bifidobacterium**), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Stärke, Stabilisator Cellulose, Farbstoff Titandioxid, Geliermittel Carrageen, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Maltodextrin, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin, Cholecalciferol (Vitamin D<sub>3</sub>), Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>).

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Nährwerte pro	1 Kapsel	4 Kapseln	100 g
Brennwert	4 kJ 0,9 kcal	16 kJ 3,7 kcal	1097 kJ 258 kcal
Fett	0,004 g	0,017 g	1,2 g
davon gesättigte Fettsäuren	0,004 g	0,017 g	1,2 g
Kohlenhydrate	0,06 g	0,25 g	17 g
davon Zucker	0,06 g	0,25 g	17 g
Eiweiß	0,16 g	0,65 g	45 g
Salz	< 0,01 g	< 0,01 g	0,4 g
Vitamin D	0,83 µg	3,32 µg	0,0002 g
Vitamin B <sub>1</sub>	0,7 mg	2,8 mg	0,19 g
Vitamin B <sub>2</sub>	0,8 mg	3,2 mg	0,22 g
Folsäure	100 µg	400 µg	0,028 g
Vitamin B <sub>12</sub>	0,5 µg	2,0 µg	0,0001 g
Biotin	15 µg	60 µg	0,004 g
L-Glutamin	100 mg	400 mg	28 g
Lactobacillus acidophilus, LA-5®	20,7 mg	82,8 mg	5,7 g
Bifidobacterium, BB-12®	6,3 mg	25,2 mg	1,7 g
KbE (Koloniebildende Einheiten)	5,7 x 10 <sup>9</sup>	2,28 x 10 <sup>10</sup>	

**Verzehrempfehlung:** 2x täglich (morgens und abends) 2 Kapseln vor oder zu den Mahlzeiten einnehmen.

**Wichtige Hinweise:** Ergänzende bilanzierte Diät. Kein vollständiges Lebensmittel. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

**ProBio-Cult® Duo** ist bitte trocken und nicht über 25 °C zu lagern.

Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Bitte verwenden Sie die Kapseln nicht über das auf der Packung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus.

**Erhältliche Packung:**

Packung mit 10,9 g (30 Kapseln à 363 mg), PZN: 13335759

Packung mit 36,3 g (100 Kapseln à 363 mg), PZN: 13837308

**ProBio-Cult® Duo** ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz

# PROBIO-CULT®

## JUNIOR

### DARMFLORENZA-BALANCE

**Biotin für die Darmschleimhaut sowie Folsäure,  
Vitamin B<sub>12</sub>, Milchsäurebakterien und Inulin**

Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:** Traubenzucker, Inulin (25%), Maltodextrin, Maisstärke, Milchsäurebakterien (Streptococcus thermophilus 0,8%, Lactobacillus rhamnosus 0,2%, Lactobacillus acidophilus 0,2%, Bifidobacterium bifidum 0,1%, Bifidobacterium breve 0,1%, Bifidobacterium infantis 0,1%), Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), D-Biotin, Cyanocobalamin (Vitamin B<sub>12</sub>).

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Zusammen- setzung je Tagesportion	1 Stick	2 Sticks	NRV* 1/2 Sticks
Folsäure	200 µg	400 µg	100 % / 200 %
Biotin	50 µg	100 µg	100 % / 200 %
Cyanocobalamin	2,5 µg	5 µg	100 % / 200 %
Streptococcus thermophilus	8 mg	16 mg	**
Lactobacillus acidophilus	2 mg	4 mg	**
Lactobacillus rhamnosus	2 mg	4 mg	**
Bifidobacterium bifidum	1 mg	2 mg	**
Bifidobacterium breve	1 mg	2 mg	**
Bifidobacterium infantis	1 mg	2 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Verzehrempfehlung:** 1-2 Sticks vor oder zu den Mahlzeiten einnehmen. Kindern ab 6 Monate wird 1 Stick alle 2 Tage empfohlen. Ab 3-11 Jahren kann täglich 1 Stick empfohlen werden. Der Inhalt des Sticks kann auch in Wasser, Fruchtsaft oder anderen Kaltgetränken aufgelöst und getrunken werden.

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern..

**ProBio-Cult® Junior** bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Ausgangsstoffe aus pflanzlichen oder natürlichen Bestandteilen können gewissen Farbschwankungen unterliegen. Leichte farbliche Unterschiede beeinflussen nicht die Qualität des Produktes.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

**Erhältliche Packung:**

Packung mit 30 g (30 Sticks à 1 g), PZN: 13862341

**ProBio-Cult® Junior** ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ farbstoff- und konservierungsstofffrei  
lt. Gesetz

# PROBIO-CULT®

## PUR 15

### DARMFLORA-BALANCE

**15 ausgesuchte Milchsäurekulturen und Bio-Inulin. Vegane Kapseln.**

Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:** BIO-Inulin, BIO-Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose (vegane Kapselhülle), Gellan, 15 Milchsäurekulturen (4,8 %): (Maltodextrin, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Streptococcus thermophilus).

<b>Nährwerttabelle</b>		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	2 Kapseln	NRV* 2 Kapseln
Inulin BIO	642,6 mg	**
Milchsäurekulturenmischung von mind. $2 \times 10^9$ KbE aus: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis ssp. lactis, Streptococcus thermophilus	43,2 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden



**Verzehrempfehlung:** Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren nehmen täglich 2 Kapseln vor oder zu den Mahlzeiten ein. 2 Kapseln enthalten die Anzahl von mind.  $2 \times 10^9$  koloniebildenden Einheiten (KbE).

Hinweise: Sollten Sie zeitgleich Antibiotika einnehmen, halten Sie 2 Stunden Abstand zu dieser Einnahme.

**Hinweise:** Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

**ProBio-Cult® Pur 15** bitte trocken und nicht über 25 °C lagern.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

**Erhältliche Packung:**

Packung mit 32,4 g (60 Kapseln à 540 mg), PZN: 14143097

**ProBio-Cult® Pur 15** ist:

- ✓ laktosefrei
- ✓ gelatinefrei
- ✓ glutenfrei
- ✓ hefefrei
- ✓ farbstoff- und konservierungsstofffrei  
lt. Gesetz
- ✓ vegan
- ✓ titandioxidfrei



Effektiver Einsatz der Milchsäurekulturen im Darm durch magensaftresistente Kapseln mit zeitverzögerter Freisetzung.



NL-BIO-01  
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

# PROBIO-DENT®

## MUNDFLORA-BALANCE

**Schützt vor Karies und Parodontose,  
verringert Zahnbelag und spendet frischen Atem**

Lutschtabletten zur Zahn- und Mundpflege

Der in **ProBio-Dent®** genutzte probiotische Stamm Streptococcus salivarius M18 (über 100 Millionen nützliche Mikroorganismen pro Lutschtablette) wurde auf spezielle Eigenschaften selektioniert und aus einer gesunden menschlichen Mundflora isoliert und kultiviert.

Streptococcus salivarius M18 unterstützt als natürliches Mitglied unserer gesunden Mundflora das Gleichgewicht zwischen den Keimen und dessen pflegende und harmonisierende Effekte wirken sich positiv auf die Erhaltung der Mundflora-Balance aus.

Daher leisten **ProBio-Dent®** Lutschtabletten einen sinnvollen Beitrag zur optimalen Zahnpflege und Mundhygiene. Der angenehme Geschmack nach Minze sorgt für frischen Atem und ein lang anhaltendes frisches Mundgefühl. Das Ergebnis: saubere Zähne, kräftiges Zahnfleisch, frischer Atem!

Ingredients: Isomalt, Maltodextrin, Trehalose, Streptococcus Salivarius M18, Magnesium Stearate, Lactitol, Acacia Senegal Gum, Aroma

**Anwendung:** Lutschen Sie nach der abendlichen Zahnreinigung 1 Tablette. Diese bitte vollständig im Mund zergehen lassen. Ein Verschlucken ist unschädlich.

Hinweis: Bitte trocken und nicht über 25° C lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

### **Erhältliche Packungsgröße:**

Packung mit 20 Tabletten, PZN: 11220012

**ProBio-Dent®** ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ farbstoff- und konservierungsstofffrei

# REGACAN®

## IMMUN-BALANCE

**Mit Zink, Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit  $\beta$ -D-Glucanen und Maitakepulver**

### Nahrungsergänzungsmittel

**Zutaten:** Konzentrat aus *Saccharomyces cerevisiae* mit  $\beta$ -D-Glucanen (56,5 %), Maitakepulver (17,7 %), Füllstoff Cellulose, Zinkgluconat, Füllstoff Natriumcarboxymethylcellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Trennmittel Siliciumdioxid.

Nährwerttabelle		
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	3 Tabl.	NRV* 3 Tabl.
Zink	5 mg	50 %
Konzentrat aus <i>Saccharomyces cerevisiae</i> mit Beta-D-Glucanen	1,05 g	**
Maitakepulver	330 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Verzehrempfehlung:** Täglich drei Tabletten. Entweder nehmen Sie 3 Tabletten gleichzeitig, idealerweise abends oder 3 mal eine Tablette über den Tag verteilt mit Flüssigkeit ein.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Hinweis: Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern.

### Erhältliche Packungen:

Packung mit 18,6 g (30 Tabletten à 620 mg), PZN: 13335742

Packung mit 55,8 g (90 Tabletten à 620 mg), PZN: 01754451

**Regacan®** ist:

- ✓ glutenfrei
- ✓ laktosefrei
- ✓ farbstoff- und konservierungsstofffrei  
lt. Gesetz
- ✓ vegan

# REGAZYM<sup>®</sup>

## PLUS

### ENZYM-BALANCE

**Mit Magnesium, Enzymen und Algenpulver**

**Nahrungsergänzungsmittel**

**Zutaten:** Füllstoffe (Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure, Enzymgemisch (Enzymkonzentrate aus: *Aspergillus oryzae* (7,8%), Kiwi (1,3%), Ananas (0,5%), Feige (0,4%), Papaya (0,3%)), Überzugsmittel (Ethylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Speisefettsäuren), Maltodextrin, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Talkum), Kaliumcitrat, Verdickungsmittel Natriumalginat, Spirulinaalgenpulver (0,8%), Farbstoff Titandioxid, Säureregulator Ammoniumhydroxid, pflanzliches Öl (Kokosnuss).

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	2 Tabl.	4 Tabl.	NRV* 2/4 Tabl.
Magnesium	28 mg	56 mg	8 % / 15 %
Enzymkonzentrat aus <i>Aspergillus oryzae</i>	140 mg	280 mg	**
Enzymkonzentrat aus Kiwi	23 mg	47 mg	**
Spirulinaalgenpulver	15 mg	30 mg	**
Enzymkonzentrat aus Ananas	9,3 mg	19 mg	**
Enzymkonzentrat aus Feige	7,8 mg	16 mg	**
Enzymkonzentrat aus Papaya	6,2 mg	12 mg	**

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Verzehrempfehlung:** Nehmen Sie täglich 3 x 1-2 Tabletten vor den Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) unzerkaut mit etwas Flüssigkeit ein..

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Hinweis: **Regazym® Plus** bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Ausgangsstoffe aus pflanzlichen Bestandteilen können gewissen Farbschwankungen unterliegen. Dies beeinflusst nicht die Qualität von **Regazym® Plus**.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen.

Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

**Erhältliche Packungen:**

Packung mit 36,5 g (60 Tabletten á 608 mg), PZN: 01421502

Packung mit 85,1 g (140 Tabletten á 608 mg), PZN: 01421519

**Regazym® Plus** ist:

- ✔ glutenfrei
- ✔ laktosefrei
- ✔ hefefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ vegan

# REMISYX®

## MILIEU-BALANCE

### Rechtsdrehende Milchsäure

### Nahrungsergänzungsmittel mit L(+)-Milchsäure und dem Mineralstoff Zink

**Zutaten:** Wasser, L(+)-Milchsäure (21 %), Zinkgluconat.

#### Nährwerttabelle

Durchschnittliche Zusammensetzung je Tagesportion	20 Tropfen	60 Tropfen	NRV* 20/60 Tropfen
Zink	2,5 mg	7,5 mg	25 %/75 %

\* NRV (Nährstoffbezugswerte) für Erwachsene nach der Lebensmittel-Informationsverordnung

\*\* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

**Verzehrempfehlung:** Täglich 1-3 x 20 Tropfen in reichlich Wasser, Fruchtsaft oder Tee einnehmen. Die Tagesdosis von 20 (60) Tropfen **Remisyx®** deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Zink zu 25 (75) % gem. Lebensmittelinformations-Verordnung.

**Remisyx®** darf nicht unverdünnt eingenommen werden. Deshalb auch für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Mindesthaltbarkeitsdatum beachten!

Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden oder eine gesunde Lebensweise ersetzen. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Bitte trocken und nicht über 25 °C lagern. Gebrauchsanweisung beachten.

#### Erhältliche Packungen:

Packung mit 100 ml Lösung, PZN: 09634427

**Remisyx®** ist:

- ✓ glutenfrei
- ✓ hefefrei
- ✓ laktosefrei
- ✓ farbstofffrei
- ✓ vegan

# SELEN-FORTE SYXYL

## IMMUN-BALANCE

### Zur diätetischen Behandlung eines Selen-Mangels

z. B. bei reduzierter Immunabwehr, bei Fehl- und Mangelernährung, nach Strahlen- und Chemotherapie sowie im Rahmen der Krebsnachsorge

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Ergänzende bilanzierte Diät) mit Natriumselenit, Rotweitraubenkonzentrat und Glutamin.

**Zutaten:** Rotweitraubenkonzentrat (46%) (Traubenextrakt **enthält Sulfit**, Maltodextrin, Rotweinkonzentrat **enthält Sulfit**), L-Glutamin, Füllstoff Cellulose, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Rote Bete Saft Konzentrat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose, Farbstoff Titandioxid, pflanzliches Öl (Kokos und Palmkern), Natriumselenit, Maltodextrin.

<b>Nährwerttabelle</b>			
Durchschnittliche Nährwerte pro	1 Tablette	3 Tabletten	100 g
Brennwert	6,1 kJ 1,4 kcal	18 kJ 4,3 kcal	1400 kJ 333 kcal
Fett	< 0,01 g	0,013 g	1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren	< 0,01 g	0,013 g	1,0 g
Kohlenhydrate	0,17 g	0,51 g	39 g
davon Zucker	< 0,01 g	0,017 g	1,3 g
Eiweiß	0,13 g	0,39 g	30 g
Salz	< 0,01 g	< 0,01 g	0,28 g
davon Natrium	< 0,01 g	< 0,01 g	0,11 g
Selen	100 µg	300 µg	0,023 g
L-Glutamin	100 mg	300 mg	23 g
Rotweitraubenkonzentrat	200 mg	600 mg	46,0 g

**Verzehrempfehlung:** 1 Tablette täglich zu einer Mahlzeit unzerkaut schlucken. Die Verzehrmenge kann in Absprache mit dem Therapeuten (Arzt) auf max. 3 Tabletten erhöht werden. Die Selendosis ist den Anforderungen entsprechend erhöht.

**Wichtige Hinweise: Selen-Forte Syxyl** ist ein ergänzende bilanzierte Diät und kein vollständiges Lebensmittel. Der gleichzeitige Verzehr von Natriumselenit und Vitamin C sollte vermieden werden, da hierdurch die optimale Verfügbarkeit von Natriumselenit beeinträchtigt werden kann. Ein zeitlich versetzter Verzehr (mindestens eine Stunde) hat dagegen keinen Einfluss mehr. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Die Tabletten trocken und nicht über 25 °C lagern.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Bitte verwenden Sie die Tabletten nicht über das auf der Packung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus.


**Erhältliche Packung:**

Packung mit 43,5 g (100 Tabletten á 435 mg), PZN: 06151711

**Selen-Forte Syxyl** ist:

- ✔ laktosefrei
- ✔ gelatinefrei
- ✔ glutenfrei
- ✔ hefefrei
- ✔ konservierungsstofffrei lt. Gesetz
- ✔ vegan





Syxyl GmbH & Co. KG  
Gereonsmühlengasse 5  
50670 Köln

[dialog@syxyl-service.de](mailto:dialog@syxyl-service.de)

[WWW.SYXYL.DE](http://WWW.SYXYL.DE)

270324

Aus der Natur . In die Balance.

**SYXYL**