

GINKGO SYXYL TABLETTEN

Wirkstoff: Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4;
[HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)]

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Ginkgo Syxyl Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind oder wenn Sie Erfahrungen mit einer der aufgeführten Nebenwirkungen gemacht haben, die schwerwiegend sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet

1. Was sind **Ginkgo Syxyl Tabletten** und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von **Ginkgo Syxyl Tabletten** beachten?
3. Wie sind **Ginkgo Syxyl Tabletten** einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind **Ginkgo Syxyl Tabletten** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was sind Ginkgo Syxyl Tabletten und wofür werden sie angewendet?

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis

Sollten während der Anwendung die Krankheitssymptome fortauern, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten beachten?

Ginkgo Syxyl Tabletten dürfen nicht eingenommen werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba
- in der Schwangerschaft
- von Kindern unter 6 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten ist erforderlich

Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Stillzeit nicht angewendet werden.

Kinder

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern von 6 bis 18 Jahren nicht angewendet werden.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen wurden aus Berichten zu pflanzlichen Extrakten aus Ginkgo biloba abgeleitet:

Patienten mit einer krankhaft erhöhten Blutungsneigung (hämorrhagische Diathese) und gleichzeitiger Einnahme von gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulantien, z. B. Phenprocoumon) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. ASS) sollten **Ginkgo Syxyl Tabletten** nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Zubereitungen aus Ginkgo können zu einer Verstärkung der Blutungsneigung führen, die Einnahme von **Ginkgo Syxyl Tabletten** sollte deshalb 3 bis 4 Tage vor einer Operation vorsichtshalber beendet werden.

Bei Patienten mit Epilepsie kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen das Auftreten weiterer Anfälle gefördert wird.

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-haltigen Produkten und Efavirenz wird nicht empfohlen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Die folgenden Wechselwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

Wird das Arzneimittel **Ginkgo Syxyl Tabletten** gleichzeitig mit gerinnungshemmenden Arzneimitteln (Antikoagulantien, z. B. Phenprocoumon und Warfarin) und Medikamenten, welche die Verklumpung von Blutplättchen hemmen (Thrombozytenaggregationshemmer, z. B. Clopidogrel, Acetylsalicylsäure und andere nicht-steroidale Antiphlogistika [z. B. Ibuprofen, Diclofenac]) angewendet, kann deren Effekt beeinflusst werden.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Ginkgo biloba mit Warfarin, Dabigatran oder Nifedipin (Erhöhung der Wirkstoffkonzentration im Blut).

Die gleichzeitige Anwendung von Ginkgo biloba-Zubereitungen und Efavirenz wird nicht empfohlen (Erniedrigung der Wirkstoffkonzentration von Efavirenz im Blut).

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Ginkgo Syxyl Tabletten

Dieses Arzneimittel enthält Milchzucker (Lactose). Bitte nehmen Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose (Milchzucker) ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galactose-Unverträglichkeit (Galactoseintoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption (Störung der Aufnahme von Glucose und Galactose in die Blutbahn) leiden.

3. Wie sind Ginkgo Syxyl Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Ginkgo Syxyl Tabletten** zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie Ginkgo Syxyl Tabletten einnehmen?

Allgemeiner Hinweis

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Ginkgo Syxyl Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten:

Über akute Vergiftungen durch **Ginkgo Syxyl Tabletten** ist beim Menschen bisher nicht berichtet worden. Setzen Sie bitte die Behandlung beim nächsten Einnahmezeitpunkt mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Einnahme von Ginkgo Syxyl Tabletten vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern setzen Sie die Einnahme von **Ginkgo Syxyl Tabletten** mit der üblichen Dosis fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen

Die folgenden Nebenwirkungen wurden für pflanzliche Extrakte aus Ginkgo biloba berichtet:

- Blutungen in verschiedenen Organen (Augen, Nase, Hirn- und Magen-Darm-Blutungen)
- Kopfschmerzen und Schwindel
- Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen
- Überempfindlichkeit (allergischer Schock)
- allergische Hautreaktionen (Rötung, Schwellung, Juckreiz und Ausschlag)

Hinweis

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Ginkgo Syxyl Tabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Bitte bewahren Sie **Ginkgo Syxyl Tabletten** stets in dem Umkarton und nicht über 25 °C auf. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blisterstreifen angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. Weitere Informationen

Zusammensetzung:	
Wirkstoff	1 Tablette enthält
Ginkgo biloba e foliis sicc. Trit. D4 [HAB, Vorschrift 4a, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)]	100 mg

Sonstige Bestandteile

Magnesiumstearat, Kartoffelstärke

Ginkgo Syxyl Tabletten sind in der Originalpackung zu 120 Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Syxyl GmbH & Co.KG
Gereonsmühlengasse 5 · 50670 Köln
Telefon: 0800/1652400 · Telefax: 0800/1652700
E-Mail: dialog@syxyl-service.de

Hersteller

Artesan Pharma GmbH & Co.KG
Wendlandstr. 1, 29439 Lüchow

Stand der Information

Februar 2017