

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Bitte bewahren Sie **Dormosyx** stets in dem Umkarton verschlossen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeit.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Dormosyx enthält

10,0 g Mischung enthalten:

Wirkstoffe:

Avena sativa ø 3,34 g
Passiflora incarnata ø 3,33 g
Valeriana officinalis ø 3,33 g
1 g entspricht 32 Tropfen.

Wie Dormosyx aussieht und Inhalt der Packung

Dormosyx ist in der Originalpackung zu 30 ml Mischung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

SyxyI GmbH & Co.KG, Gereonsmühlengasse 5, 50670 Köln

Telefon: 0800/1652-400, Telefax 0800/1652-700

E-Mail: dialog@syxyI-service.de

Hersteller:

Johannes Bürger Ysatfabrik GmbH, Herzog-Julius-Straße 83, 38667 Bad Harzburg

Mitvertreiber:

Artesan Pharma GmbH & Co.KG, Wendlandstr. 1, 29439 Lüchow

Telefon: 05841/9390, Telefax: 05841/939200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet in 05/2014.

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Dormosyx

Wirkstoffe:
Avena sativa ø
Passiflora incarnata ø
Valeriana officinalis ø
Mischung zum Einnehmen

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON DORMOSYX BEACHTEN?

Dormosyx darf nicht angewendet werden

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Avena sativa (Hafer), Passiflora incarnata (Passionsblume), Valeriana officinalis (Baldrian) oder einen der sonstigen Bestandteile von **Dormosyx** sind.

– bei Alkoholkranken

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Dormosyx ist erforderlich:

Wegen des Alkoholgehaltes soll **Dormosyx** bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Dormosyx zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

sind keine Besonderheiten zu beachten.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Dormosyx

Dieses Arzneimittel enthält 63 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST DORMOSYX EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie **Dormosyx** immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 5 bis 10 Tropfen einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3 mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von **Dormosyx** zu stark oder zu schwach ist.

Wie lange sollten Sie Dormosyx einnehmen?

Allgemeiner Hinweis:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Wenn Sie eine größere Menge Dormosyx eingenommen haben, als Sie sollten:

Über akute Vergiftungen durch **Dormosyx** ist beim Menschen bisher nicht berichtet worden. Setzen Sie bitte die Behandlung beim nächsten Einnahmezeitpunkt mit der üblichen Dosis fort.

Wenn Sie die Einnahme von Dormosyx vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben, sondern setzen Sie die Einnahme von **Dormosyx** mit der üblichen Dosis fort.